



# ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ



Головная вошь



Гниды головных вшей, прикрепленные к волосам

В течение 3 дней вошь откладывает до 45 яиц. Через 8-10 дней гнида превращается в личинку, а затем во взрослую вошь, которая через 10-15 дней сама начинает откладывать яйца. Длительность жизни вши 38 дней. Вне хозяина головная вошь живет не более 55 часов.

**Симптомы:** сильный зуд и раздражение в месте укуса насекомого. На коже головы появляются расчесы, корки, которые могут инфицироваться и воспалиться, что приводит к вторичной инфекции (пиодермии) и увеличению лимфатических узлов. В тяжелых случаях образуется «колтун» - склеенная экссудатом масса спутанных волос, вшей, гнид и корок. Наибольшее количество укусов и раздражений кожи наблюдается в области затылка, висков и за ушными раковинами.

## Вшивость (педикулез)

вызывается насекомыми – вшами. Различают педикулез: головной, платяной и лобковый. Заражение людей вшами происходит в ограниченных группах. У детей в летнее время чаще всего встречаются головные вши. Головные вши живут на волосистой части головы, питаются кровью и откладывают яйца, прикрепляя их к волосам (гниды).



## Чесотка (скабиес)

вызывается насекомыми - чесоточными клещами. Чаще встречается среди детей, так как тонкий кожный покров способствует легкому проникновению клеща. Самки чесоточного клеща, оказавшись на коже, прокладывают внутрикожные ходы, в которые откладывают яйца. Продолжительность жизни самки – 1,5 месяца, за это время она откладывает около 40-50 яиц. Вещество, вызывающее зуд, выделяет самка. Полный цикл развития занимает 2 недели. Вне хозяина клещи живут 5-14 дней. Заражение происходит при прямом контакте с больным: через постельное или нательное белье, рукопожатие, полотенце, мочалки, игрушки.



**Симптомы:** резкий зуд в ночное время. На коже появляются высыпания в виде красных пятнышек. Чесоточные ходы проявляются в виде тонких полосок сероватого цвета длиной 1-3 см, на одном конце которых видна черная точка – самка клеща. Чесоточные ходы бывают чаще всего в области запястья, боковых поверхностях пальцев, в межпальцевых складках. У маленьких детей чесоткой поражается любой участок кожи и напоминает крапивницу.



## Профилактика

- Соблюдение элементарных правил личной гигиены: возвращаясь домой, мойте руки с мылом.
- Расчесывание волос личной расческой. Имейте чистую постель и проглаженное белье.
- При обнаружении симптомов педикулеза или чесотки, ребенка необходимо отстранить от посещения детского учреждения до конца курса лечения.
- Проведение профилактического осмотра всех, кто находился в контакте с инфицированным человеком.
- Дезинфекция белья и предметов домашнего обихода для предупреждения распространения инфекции.

**При появлении первых признаков чесотки или педикулеза обратитесь к врачу!**



16+